

Rekommendationer för barn med cancer och deras familjer under Covid-19-pandemin

Pandemin med det nya coronaviruset påverkar hela samhället och det är naturligt att känna stor oro för sig själv, sina närmaste och särskilt för ett barn med cancerdiagnos.

För barncancervården i Sverige är det viktigt att prioritera säkerheten för barncancerpatienter och för vårdpersonal. Det gäller såväl risker för infektion samt att säkerställa genomförande av cancerbehandling och kontroller efter behandling. Inverkan på barnets och familjens hela livssituation behöver också vägas in.

Barncancervården måste följa direktiv från myndigheter, regioner och sjukhusorganisation, samt väga in barnonkologisk högspecialiserad kompetens. Information från barnonkologer i norra Italien, samt andra nationella och internationella rapporter beskriver endast få konstaterade fall och då med lindrigt sjukdomsförlopp. Internationella rekommendationer för barncancerpatienter baseras på samma underlag som vi i Sverige har att tillgå dvs mycket begränsad kunskap och evidens.

Myndigheter och regioners övergripande rekommendationer bör alltid följas och efterlevas liksom rekommendationer för specifika patientgrupper, såsom stamcellstranplanterade patienter, eller rekommendation för enskild patient från behandlande läkare.

Efter sammanvägning av ovanstående rekommenderar PHO följande under Corona-pandemin:

- 1) Barn under aktiv cancerbehandling och 3 månader efter avslutad behandling med familj skall helt avstå från att träffa andra personer med infektionssymtom, även lindriga, och rekommenderas fråga efter sjukdomssymtom innan kontakter utanför hushållet.
- 2) Kunskapsläget gällande risker vid sociala kontakter utanför hemmet (tex förskola/skola) är än så länge oklart varför entydiga övergripande rekommendationer ej kan inte ges. Rekommendationer för barnets sociala kontakter med friska personer utanför hemmet bör ske i samråd med behandlande läkare.
- 3) I samband med vårdkontakter och behandlingstillfällen bör patienten vistas på enkelrum med endast en frisk förälder/vårdnadshavare, så långt det är möjligt.
- 4) Om möjligt sker vårdkontakt per telefon eller som videobesök.
- 5) Noggrann information till familj om att alltid kontakta och informera om infektionssymtom hos barn eller medföljande för anpassat mottagande enligt lokal rutin.
- 6) Provtagning för SARS-CoV-2 skall utföras enligt lokal riktlinje.
- 7) Säkerställ utbildning och tydlig instruktion avseende skyddsutrustning för vårdpersonal enligt sjukhusets/klinikens rutin.
- 8) Tillse att sjukhusets lokaler anpassas och möjliggör tillräckligt avstånd till andra personer dvs undvika trängsel. Det gäller såväl vårdytor som administrativa lokaler.
- 9) Överväg digitala möten/ronder/konferenser när det är möjligt.
- 10) Tillse plan för omställning av verksamheten och ökat behov av personal vid högre sjukfrånvaro.

//Upprättade av PHO-styrelsen april 2020